

Kirurgian poliklinikka ja toimenpideyksikkö

Potilasohje Eksote

PEG -RUOKINTALETKUN VAIHTO

PEG- letkun vaihtaa ensimmäisen kerran lääkäri. Letkun poisto tapahtuu vatsan peitteiden läpi vetämällä.

ENNEN LETKUN VAIHTOA

Teidän tulee olla ravinnotta (tarkoittaa sekä letkuravintoa että ruokailua suun kautta) vähintään 6 tuntia. Aamulääkkeet voitte ottaa vähintään kaksi tuntia ennen endoskopiayksikköön tuloa.

Letkunvaihdon jälkeen voitte ruokailla normaaliin tapaan ja jatkaa päiväohjelmaanne.

LETKUN VAIHTO JATKOSSA

Teille opastetaan ensimmäisen letkunvaihdon yhteydessä syöttöletkun itsenäinen vaihto sekä huoltotoimenpiteet. Jatkossa letkun vaihto suoritetaan joko kotona tai omassa terveyskeskuksessa ja sen vuoksi olisi hyvä, että henkilö joka jatkossa letkun vaihtaa tulisi mukaan seuraamaan toimenpidettä ja samalla harjoittelemaan sitä.

Uudet syöttöletkut ja siihen tarvittavat apuvälineet saatte oman kuntanne hoitotarvikejakelusta tai terveyskeskuksesta.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Tarvittaessa voitte jättää soittopyynnön kirurgian poliklinikan endoskopiayksikön sairaanhoitajalle ma – pe klo 8.00 – 15.00 puh. (05) 352 6000.