

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

Virtaustilavuusspirometria - diagnostinen keuhkojen toimintatutkimus

Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksella selvitetään keuhkojen tilavuutta ja tuuletuskykyä sekä mahdollisen tuuletuskyvyn häiriön luonnetta ja vaikeusastetta. Tarvittaessa selvitetään tuuletuskyvyn häiriön palautuvuutta.

Valmistautuminen tutkimukseen

Luotettavien tutkimustulosten saamiseksi ennen tutkimusta tulee olla: **1 vrk** ilman alkoholia, **2 tuntia** tupakoimatta, **4 tuntia** ilman kahvia, teetä, kolajuomia tai muita pirstäviä aineita, **4 tuntia** ilman raskasta ateraa (ei saa kuitenkaan olla täysin ravinnotta), **2 tuntia** ennen tutkimusta tulee välttää fyysistä rasitusta.

Tutkimukseen tullessa on käytettävä hissiä!

Tutkimuksen suoritus Tutkimuksessa hengitetään rauhallisesti ja/tai puhalletaan voimakkaasti suukappaleeseen hoitajan ohjeistuksen mukaan useita kertoja. Puhallukset voivat tuntua usein lievästi rasittavilta. Tutkimus kestää noin 30–45 minuuttia.

Lääketauko

12 tuntia:

Adrenalin	Bricanyl	Efedrin	Efedriini hydrokloridi	Lomudal	Salbutamol
Airomir	Buventol	Efedriini	Epipen	Racineprine	Ventilastin
				Rinexin	Ventoline

1 vuorokausi:

Atrodual Atrovent Atrovent comp Ipramol Ipraxa Tilade

2 vuorokautta:

Cykloferol Eklira Fomeda Formoterol Serevent
Duaklir Foradil Formaxa Oxis

3 vuorokautta:

Accolate Astecon Montelukast Retafyllin Theofylliini
Aminocon Euphyllong Nuelin depot Theofol Singulair
Anoro Incruse Theofol comp Kaikki yskänlääkkeet

4 vuorokautta: Spiriva

5 vuorokautta: Daxas

7 vuorokautta: Inspiolto, Onbrez, Stiverdi,

12 vuorokautta: Seebri, Ultibro

4 viikkoa:

Aerobec	Bufomix	Hydrocortison	Pulmicort
Alvesco	Dexametason	Innovair	Relvar
Asmanex	Entocort	Medrol	Salflumix Easyhaler
Beclomet	Flixotide	Novopulmon	Salmeterol/Fluticason Orion
Budenofalk	Flutide	Prednisolon	Seretide
Budenoside	Flutiform	Prednison	Solomet
			Symbicort

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

Muut kuin hengitystiesairauksiin määrätyt lääkkeet (esim. sydän- ja verenpainelääkkeet) pitää ottaa normaalisti!!

Tutkimuksen peruuntuminen

Tutkimus tehdään aikaisintaan **2 viikkoa hengitystietulehduksen paranemisesta** (esim. flunssa, poskiontelotulehdus).

Mikäli haluat muuttaa aikoja esteiden tai sairastumisen vuoksi, on ajanmuutoksesta soitettava hoitavaan poliklinikkaan tai osastoon.

Ajanvaraus tutkimukseen

Tutkimusta varten on tehtävä ajanvaraus!

Keskitetty ajanvaraus ma-pe klo 7:30-16:00 puh. (05) 352 6000 (Armilan, Honkaharjun, Rautjärven, Taipalsaaren, Joutsenon, Luumäen ja Savitaipaleen laboratorioon)

- Teille ei ole vielä tehty ajanvarausta tutkimukseen. Tehkää ajanvaraus!
- Teille on tehty ajanvaraus tutkimukseen. Teille varattu aika on;
- Armilan laboratoriossa
- Honkaharjun laboratoriossa
- Rautjärven laboratoriossa
- Taipalsaaren laboratoriossa
- Joutsenon laboratoriossa
- Luumäen laboratoriossa
- Savitaipaleen laboratoriossa

Päivämäärä: _____

Klo: _____

Ottakaa Kela- tai ajokortti mukaan!

Varatun ajan peruutus tai muutos on tehtävä viimeistään edellisenä arkipäivänä klo 15:00 mennessä!