

Vastuhenkilö: **SV/SAS**  
Hyväksyjä:  
Laadittu: 1.5.2016  
Hyväksytty:

## VALTIMOIDEN VARJOAINETUTKIMUS

Olette saaneet lähetteen angiografiatutkimukseen. Angiografialla tarkoitetaan verisuonten kuvaamista varjoaineella. Tutkimuksen kesto on yleensä 1-3 tuntia.

### Tutkimukseen valmistautuminen

Jos olette yliherkkä puudutusaineelle tai jodipitoiselle varjoaineelle tai olette / epäilette olevanne raskaana, kertokaa siitä lähettävälle lääkärille. METFORMIINIA sisältävät sokeritautilääkkeet on oltava tauolla tutkimuspäivänä ja kahtena seuraavana päivänä. MAREVAN tai TROMBOL nimiset lääkkeet on oltava tauolla kolme päivää ennen tutkimusta paitsi, jos teille on tehty sydämen läppäleikkaus. PLAVIX-lääkitys tulee keskeyttää viisi vuorokautta ennen tutkimusta. Jos Plavix-lääkitys on aloitettu sepelvaltimoiden stenttihoidon vuoksi, on asiasta neuvoteltava hoitavan lääkärin kanssa. Verikokeet tulee olla otettuna ennen tutkimusta omassa terveyskeskuksessa. Tutkimusta edeltävänä päivänä saatte syödä ja juoda normaalisti. Suolen tyhjentämistä varten hankkikaa apteekista Toilax-pakkaus. Käyttäkää tabletit pakkauksen ohjeen mukaan. Ottakaa pienoisperäruiske tutkimusta edeltävänä iltana.

### Tutkimus

Olkaa tutkimuspäivän aamuna ravinnotta. Ottakaa muut kuin yllämainitut lääkkeet. Älkää kuitenkaan ottako aamuinsuliinejä. Ne otetaan vasta osastolla sokeripitoisen nestetiputuksen laitton jälkeen. Saapukaa sovittuna aikana Etelä-Karjalan keskussairaalan osastolle LEIKO. Joissakin tapauksissa potilaat kutsutaan saapumaan osastolle tutkimusta edeltävänä päivänä. Tästä ilmoitetaan erikseen puhelimitse. Ottakaa mukanne henkilökohtaiset tarvikkeenne ja lääkkeenne. Ennen röntgeniin menoa teiltä otetaan verikoe sekä sydänfilmi. Ihokarvat poistetaan navasta reiden puoliväliin ja laitetaan virtsakatetri. Saatte tarvittaessa rauhoittavan esilääkkeen ennen tutkimusta. Tutkimuksen aikana olette makuulla tutkimuspöydällä liikkumatta. Teille kerrotaan tutkimuksen etenemisestä. Tutkimus tehdään yleensä nivustaipeen valtimon kautta paikallispuudutuksessa. Verisuoneen laitetaan kuvauskatetri, ruiskutetaan varjoainetta ja otetaan röntgenkuvia. Varjoaine saattaa aiheuttaa lämmöntunnetta. Tutkimukseen saattaa liittyä toimenpide.

### Jälkihoito

Pistopaikan sulkemisen jälkeen vuodelepo osastolla on 1-6 tuntia. Mahdollisen toimenpiteen jälkeen kotiudutte seuraavana päivänä.