

Röntgen

Potilasohje Eksote

YLÄRAAJAN LASKIMOTUTKIMUS

Ennen tutkimukseen tuloa varmistakaa, että ette ole raskaana. Jos teillä on todettu aikaisemmin varjoaineyliherkkyys, ilmoittakaa siitä röntgeniin heti tämän kirjeen saatuanne.

LÄÄKETAUKO

Mikäli teillä on käytössä suun kautta otettava sokeritautilääkitys, jossa vaikuttavana aineena on metformiini, on lääkityksessä pidettävä tauko. Lääkettä ei saa ottaa tutkimuspäivänä eikä kahtena seuraavana vuorokautena.

Tuotenimeltään mm. seuraavat valmisteet sisältävät vaikuttavana aineena Metformiinia: Competact, Diformin, Diformin Retard, Eucreas, Glucophage, Janumet, Metforem, Metformin, Metformin Actavis, Metformin Mylan, Metformin Pfizer, Metformin Stada, Oramet, Oramet- Hexal, Velmetia.

Jos teillä on kysyttävää sokeritautilääkitykseenne liittyen, ottakaa yhteyttä sokeritautianne hoitavaan yksikköön.

VERIKOKEET

Verikokeissa tulee käydä 2 viikon sisällä ennen tutkimusta omassa terveyskeskuksessa. Lappeenrantalaiset käyvät sairaalan laboratoriossa. Tutkimusta edeltävänä päivänä saatte syödä ja juoda normaalisti. Ottakaa muut kuin yllä mainitut lääkkeet normaalisti.

TUTKIMUSPÄIVÄNÄ

Saapukaa ajanvarauksenne mukaan Etelä-Karjalan keskussairaalan röntgenosastolle.

TUTKIMUKSEN KULKU

Tutkimuksessa ruiskutetaan varjoainetta käsivarren laskimoon ja otetaan tarvittavat röntgenkuvat. Tutkimus kestää noin puolituntia. Punktiopaikka painetaan kiinni käsin.

JÄLKIHOITO

Ei jälkihoitoa.

TUTKIMUSTULOKSET

Tutkimustulokset saatte lähettävältä lääkäriltä seuraavan poliklinikkakäynnin yhteydessä tai puhelimitse, jos teillä on sovittu soittoaika lääkärillenne.

Mikäli aika ei teille sovi, ilmoittakaa siitä lähettävään yksikköön.