

Kilpirauhasmetastaasien gammakuvaus (koko keho)

Tutkimukseen valmistautuminen

Ensimmäisenä tutkimusaamuna on oltava **syömättä kaksi tuntia ennen** kuvausaineen antamista ja **kaksi tuntia** antamisen **jälkeen**.

Lääketauot:

Tutkimukseen lähetävä lääkäri antaa tarvittaessa ohjeet kilpirauhaslääkityksen tauoista ja uudelleen aloittamisesta:

- Viimeinen Tyrazol otetaan ____/____ 20____
- Viimeinen Thyroxin otetaan ____/____ 20____

Ilmoita mahdollinen jodiallergia hoitajalle ennen kuvausaineen antamista. Jos olet tai epäilet olevasi raskaana, ilmoita asiasta hoitohenkilökunnalle ennen kuvausaineen antamista.

Tietojesi käsittelyn nopeuttamiseksi esitä KELA-kortti ilmoittautuessasi tutkimukseen.

Huomioitavaa

Saattajan voi ottaa mukaan, mutta ei pieniä lapsia.

Tutkimuksen suoritus

Ensimmäisenä tutkimuspäivänä annetaan suun kautta radioaktiivinen kuvausaine, jonka jälkeen pääsee pois. Tunnin kestävä kuvaus suoritetaan seuraavana päivänä.

Tutkimuksen jälkeen

Kuvausainekapselin antamisen jälkeen on hyvä juoda tavallista enemmän parin vuorokauden aikana ja käydä usein tyhjentämässä rakko.

Tutkimuksen jälkeen on hyvä juoda tavallista enemmän.

Vältä lopun päivää läheistä kontaktia lapsiin. Älä esimerkiksi pidä lasta vieressäsi tai sylissäsi pitkiä aikoja (yli puoli tuntia).

Yleensä työhön voi aina palata suoraan tutkimuksesta. Jos olet työssäsi tekemisissä lasten kanssa, kysy neuvoa henkilökunnalta.

Venäjälle matkustavalle tiedoksi

Tutkimuspäivänä ja sitä seuraavana päivänä ei voi matkustaa Venäjälle johtuen Venäjän tullin käyttämistä säteilymääräyksistä.

Tarvittaessa voit käydä mittauttamassa annosnopeutesi kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen osastolla arkisin klo 8 – 13. Lisätietoja voi kysyä puhelinnumerosta 05 352 5467 arkisin klo 8 - 13.