

Munuaistoiminnan gammakuvaus kaptopriilitehosteisenä

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksella selvitetään mahdollista munuaisperäistä verenpainetautia.

Tutkimukseen valmistautuminen

4 tuntia ennen tutkimusta **ei saa syödä kiinteää ruokaa, kevyt ateria** (esim. jogurtti) on **sallittu**. Sinun on juotava 0.5 – 1 litraa nestettä 0.5 – 1 tuntia ennen tutkimusta.

Jos olet tai epäilet olevasi raskaana, ilmoita asiasta hoitohenkilökunnalle ennen kuvausaineen antamista.

Tietojesi käsittelyn nopeuttamiseksi esitä KELA-kortti ilmoittautuessasi tutkimukseen.

Lääkitys

Lääkäri antaa ohjeet lääkityksestä ennen tätä tutkimusta merkitsemällä rastilla oikean vaihtoehdon!

- Tavalliset lääkkeet pitää ottaa tutkimuspäivän aamuna veden kanssa.
- Seuraavat lääkkeet lopetetaan _____ vrk ennen tutkimusta:

Huomioitavaa

Metallia sisältävät vaatteet (kaarituet, vyönsoljet, metallinapit ja -vetoketjut) pitää riisua pois kuvauksen ajaksi. Saattajan voi ottaa mukaan, mutta ei pieniä lapsia.

Tutkimuksen suoritus

Tutkimus aloitetaan antamalla verenpaineeseen vaikuttavaa lääkettä. Verenpainetta mitataan 10 – 15 min välein ennen varsinaisen kuvauksen aloittamista tunnin ajan.

Radioaktiivinen kuvausaine pistetään verisuoneen ollessasi selinmakuulla. Kuvaus on kivuton ja tutkimukseen kuluu kaikkiaan aikaa noin kaksi tuntia.

Tutkimuksen jälkeen

Tutkimuksen jälkeen on hyvä juoda tavallista enemmän.

Vältä lopun päivää läheistä kontaktia lapsiin. Älä esimerkiksi pidä lasta vieressä tai sylissäsi pitkiä aikoja (yli puoli tuntia).

Yleensä työhön voi aina palata suoraan tutkimuksesta. Jos olet työssäsi tekemisissä lasten kanssa, kysy neuvoa henkilökunnalta.

Venäjälle matkustavalle tiedoksi

Tutkimuspäivänä ja sitä seuraavana päivänä et voi matkustaa Venäjälle johtuen Venäjän tullin käyttämistä säteilymääräyksistä.

Tarvittaessa voit käydä mittauttamassa annosnopeutesi kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen osastolla arkisin klo 8 – 13. Lisätietoja voi kysyä puhelinnumerosta 05 352 5467 arkisin klo 8 - 13.