

## Sappihappojen imeytymistutkimus

### Tutkimukseen tarkoitus

SeHCAT[75Se]-tauriinisuolaa käytetään sappihappojen imeytymishäiriöiden tutkimuksissa.

### Tutkimukseen valmistautuminen

Ennen kapselin nauttimista tulee olla ravinnotta neljä tuntia. Tutkimusta ei yleensä tehdä raskaana oleville naisille. Jos käytössäsi on sappihappojen imeytymiseen vaikuttavia lääkkeitä (esim. Guarem, Antepsin, Alsucral, Succosa, Questran, Lestid, Imodium), niiden käyttö pitää keskeyttää kaksi vuorokautta ennen tutkimusta ja taukoa pitää jatkaa koko tutkimuksen ajan (yhteensä yhdeksän vuorokautta).

Ilmoita mahdolliset allergiat hoitohenkilökunnalle.

### Huomioitavaa

Metallia sisältävät vaatteet (kaarituet, vyönsoljet, metallinapit ja -vetoketjut) pitää riisua pois kuvauksen ajaksi. Saattajan voi ottaa mukaan, mutta ei pieniä lapsia.

### Tutkimuksen suoritus

Isotooppilaboratoriossa otetaan SeHCAT-kapseli vesilasillisen kanssa. Kuvaukset tehdään kolmen tunnin ja seitsemän vuorokauden kuluttua SeHCAT:n ottamisesta. Ole ravinnotta SeCHAT-kapselin ottamisen jälkeen kunnes ensimmäinen kuvaus on suoritettu. Ensimmäisen kuvauksen jälkeen saa syödä normaalisti. Kuvauksen kesto on noin 10 minuuttia. Isotooppihoitajalta saat tarkan ajan seuraavaa kuvausta varten.

### Venäjälle matkustavalle tiedoksi

Tutkimuspäivänä ja sitä seuraavana päivänä ei voi matkustaa Venäjälle johtuen Venäjän tullin käyttämistä säteilymääräyksistä.

Tarvittaessa voit käydä mittauttamassa annosnopeutesi kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen osastolla arkisin klo 8 – 13. Lisätietoja voi kysyä puhelinnumerosta 05 352 5467 arkisin klo 8 - 13.