

Somatostatiinireseptoreiden gammakuvaus

Tutkimuksen tarkoitus Kuvausta käytetään harvinaisten, hormonia erittävien hermosolukasvainten etsimiseen sekä hoitovasteen seurantaan.

Tutkimukseen valmistautuminen

Kahtena tutkimusta edeltävänä päivänä tulee syödä kevyttä keittoruokaa ja juoda runsaasti. Tutkimuspäivän aamuna saa syödä kevyen aamupalan. Mikäli käytät Sandostatina tai Somatuline Autogelia, noudata hoitavalta lääkäriltä saamaasi lääkitysohjetta.

Jos olet tai epäilet olevasi raskaana tai imetät, ilmoita asiasta hoitohenkilökunnalle ennen merkkiaineen antamista.

Tietojesi käsittelyn nopeuttamiseksi esitä KELA-kortti ilmoittautuessasi tutkimukseen.

Huomioitavaa

Metallia sisältävät vaatteet (kaarituet, vyönsoljet, metallinapit ja -vetoketjut) pitää riisua pois kuvauksen ajaksi. Saattajan voi ottaa mukaan, mutta ei pieniä lapsia.

Tutkimuksen suoritus

Sinulle annetaan pieni määrä radioaktiivista merkkiainetta verisuoneen. Kuvaus alkaa noin neljän tunnin kuluttua merkkiaineen antamisesta ja kestää noin tunnin. Kuvaus tapahtuu selinmakuulla. Merkkiaineen antamisen ja kuvauksen välisenä aikanasaat halutessasipoistua osastolta.

Tutkimuksen jälkeen

Kuvausaineen antamisen jälkeen on juotava runsaastinestettä kahden vuorokauden ajan.

Vältä lopun päivää läheistä kontaktia lapsiin. Älä esimerkiksi pidä lasta vieressäsi tai sylissäsi pitkiä aikoja (yli puoli tuntia).

Yleensä työhön voi aina palata suoraan tutkimuksesta. Jos olet työssäsi tekemisissä lasten kanssa, kysy neuvoa henkilökunnalta.

Venäjälle matkustavalle tiedoksi

Tutkimuspäivänä ja sitä seuraavana päivänä et voi matkustaa Venäjälle johtuen Venäjän tullin käyttämistä säteilymääräyksistä.

Tarvittaessa voit käydä mittauttamassa annosnopeutesi kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen osastolla arkisin klo 8 – 13. Lisätietoja voi kysyä puhelinnumerosta 05 352 5467 arkisin klo 8 - 13.