

Diffuusiokapasiteetti

Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksella arvioidaan keuhkokudoksen toimintakykyä.

Valmistautuminen tutkimukseen

Lääkkeet otetaan normaalisti, **ellei** hoitava lääkäri ole määrännyt **lääketaukoa!**

Luotettavien tutkimustulosten saamiseksi ennen tutkimusta tulee olla: **1 vrk** ilman alkoholia, **2 tuntia** tupakoimatta, **4 tuntia** ilman kahvia, teetä, kolajuomia tai muita piristäviä juomia, **4 tuntia** ilman raskasta ateriaa (ei saa kuitenkaan olla täysin ravinnotta), **2 tuntia** ennen tutkimusta tulee välttää fyysistä rasitusta.

Tutkimukseen tullessa on käytettävä hissiä!

Tutkimuksen suoritus Tutkimuksessa hengitetään suukappaleeseen hoitajan ohjeistuksen mukaan useita kertoja. Laitteisto mittaa sisään ja ulos kulkevaa ilmamäärää, virtausta ja kaasujen vaihtumista. Tutkimus kestää noin 30 minuuttia.

Tutkimuksen peruuntuminen

Keuhkojen toimintakoe tehdään vasta **2 viikkoa hengitystietulehduksen paranemisesta** (esim. flunssa, poskiontelotulehdus).

Mikäli haluat muuttaa aikoja esteiden tai sairastumisen vuoksi, on ajanmuutoksesta soitettava hoitavaan poliklinikkaan tai osastoon.