

Ohutsuolen kapseliendoskopia

Tutkimuksen tarkoitus Kapselikameralla saadaan ohutsuolesta videokuva

Tutkimukseen valmistautuminen

Viikko ennen tutkimusta: lopeta rautalääke.

Tutkimusta edeltävänä päivänä: syö klo 12 lähtien vain liemiruokia (kuten kirkkaat keitot, lihaliemi, mehut, kahvi, tee, vesi)

Klo 22 lähtien ole syömättä ja juomatta tutkimuksen alkuun asti. Jos välttämätöntä, voit juoda vähän vettä.

Tutkimusaamuna: Kaksi tuntia ennen tutkimusta voit ottaa aamulääkkeet veden kera, muutoin ei saa juoda mitään!

Pukeudu väljiin vaatteisiin ja varaa mukaasi T-paita.

Tutkimuksen suoritus

Sinulle kiinnitetään vatsan alueelle leveä vyö, joka välittää kapselikameran ottamat kuvat kannettavaan rekisteröintilaitteeseen.

Tämän jälkeen nielaiset 11 x 27 mm kokoisen kapselin veden kera.

Noin kahden tunnin kuluttua varmistetaan laitteen näytöltä, että kapselikamera on edennyt ohutsuoleen, jolloin voit lähteä kotiin.

Neljän tunnin kuluttua kapselin nielaisesta voit syödä kevyen lounaan ja tämän jälkeen voit noudattaa normaalia ateriarytmiä.

Palauta laite seuraavana aamuna sovittuna aikana tutkimusyksikköön.

Kertakäyttöinen kapseli poistuu ulosteen mukana.

Huomioitava

Jos sinulla on tutkimuksen aikana tai jälkeen poikkeavia vatsaoireita, ota yhteys arkipäivänä Gastroenterologian poliklinikkaan puh. 05-352 6000/soittopyyntö tai päivystysaikana Päivystyspoliklikkaan puh. 116 117.