

Röntgen

Potilasohje Eksote

OHUTSUOLEN VARJOAINETUTKIMUS (PASSAGE)

Ennen tutkimuksen tilaamista varmistakaa, että ette ole raskaana.
Jos teillä on todettu aikaisempi varjoaineyliherkkyys, ilmoittakaa siitä röntgeniin heti tämän kirjeen saatuanne.
Ostakaan apteekista TOILAX -yhdistelmäpakkaus suolen tyhjentämistä varten.

TUTKIMUKSEN KESTO Tutkimus kestää 1-3 tuntia.

ESIVALMISTELUT Suolen tyhjennyksellä pyritään vähentämään suolen sisältöä ja kaasua, mikä häiritsee kuvien tulkintaa.

Tutkimuspäivää edeltävänä päivänä saa syödä nestemäisiä ruokia, kuten keittoa, velliä ja lihalientä. Vettä ja mehua saa juoda.

Tutkimuspäivää edeltävänä päivänä otetaan suolen tyhjennyslääkettä seuraavasti:

Klo 12 otetaan 2 kpl TOILAX -tabletteja (saa apteekista ilman reseptiä)

Klo 20 laitetaan TOILAX -pionisperäruiske. apteekista ilman reseptiä).

TUTKIMUSPÄIVÄ Tutkimuspäivän aamuna pitää juoda 0,5 litraa nestettä. Säännölliset aamulääkkeet voi ottaa.

Ilmoittautukaa tutkimuspäivänä 1. kerroksessa sijaitsevaan röntgenin toimistoon, josta teidät ohjataan tutkimuhuoneeseen.

TUTKIMUKSEN KULKU Ohutsuoli täytetään varjoaineella ja vedellä. Varjoaineen kulkua seurataan läpivalaisulla ja kuvataan.

JÄLKIHOITO Tyhjennyksen jälkeen kannattaa syöminen aloittaa kevyesti. Runsas juominen edistää varjoaineen poistumista elimistöstä.

TUTKIMUSTULOKSET Tutkimustulokset saatte lähettävältä lääkäriltä seuraavan poliklinikkakäynnin yhteydessä tai puhelimitse jos teillä on sovittu soittoaika lääkärillenne.