

Röntgen

Potilasohje Eksote

PERÄSUOLEN TOIMINTATUTKIMUS (DEFECOGRAFIA)

Ennen tutkimuksen tilaamista varmistakaa, että ette ole raskaana.
Jos teillä on todettu aikaisempi varjoaineyliherkkyys, ilmoittakaa siitä röntgeniin heti tämän kirjeen saatuanne.
Ostakaa apteekista TOILAX -yhdistelmäpakkaus suolen tyhjentämistä varten.

TUTKIMUKSEN KESTO Tutkimus kestää 1-2 tuntia.

ESIVALMISTELUT Suolen tyhjennyksellä pyritään vähentämään suolen sisältöä ja kaasua, mikä häiritsee kuvien tulkintaa.

Tutkimuspäivää edeltävänä päivänä saa syödä nestemäisiä ruokia, kuten keittoa, velliä ja lihalientä. Vettä ja mehua saa juoda reilusti.

Tutkimuspäivää edeltävänä päivänä otetaan suolen tyhjennyslääkettä seuraavasti:

Klo 12 otetaan 2 TOILAX -tablettia

Klo 20 laitetaan TOILAX -pienoisperäruiske.

TUTKIMUSPÄIVÄ Tutkimuspäivän aamuna pitää juoda 0,5 litraa nestettä. Säännölliset aamulääkkeet voi ottaa.

Ilmoittautukaa tutkimuspäivänä 1. kerroksessa sijaitsevaan röntgenin toimistoon, josta teidät ohjataan tutkimuhuoneeseen.

TUTKIMUKSEN KULKU Potilas juo varjoainetta. Naispotilaan emättimeen laitetaan tamponi. 1 tunnin päästä läpivalaisussa tarkistetaan varjoaineen saavuttama kohde. Peräsuoleen ruiskutetaan varjoainetta, jonka jälkeen suoritetaan kuvaus potilaan ponnistamatta ja potilaan ponnistaessa ja tyhjentäessä peräsuolen.

JÄLKIHOITO Suolen tyhjennyksen jälkeen syöminen kannattaa aloittaa kevyesti. Runsas juominen edistää varjoaineen poistumista suolistosta.

TUTKIMUSTULOKSET Tutkimustulokset saatte lähettävältä lääkäriltä seuraavan poliklinikkakäynnin yhteydessä tai puhelimitse jos teillä on sovittu soittoaika lääkärillenne.