

5.9.2017

SEPELVALTIMOIDEN VARJOAINETUTKIMUKSEEN JA/TAI PALLOLAAJENNUKSEEN TULEVALLE

Sepelvaltimotaudissa sydämen pinnalla oleviin valtimoihin kehittyy ahtaumia. Nämä voidaan todeta varjoainekuvauksella. Mikäli sepelvaltimoissa on ahtaumia, jotka soveltuvat pallolaajennushoitoon, toimenpide voidaan tehdä useimmiten saman tien. Hoitovaihtoehtoista keskustellaan kanssasi kuvauksen yhteydessä. Toimenpiteeseen voi liittyä haittoja, kuten pistopaikan vuotoa. Vakavat haitat ovat kuitenkin harvinaisia. Tutkimus on sinun kohdallasi arvioitu tarpeelliseksi.

Mikäli sinulle on aiemmin tehty ohitusleikkaus tai pallolaajennus, ota mukaasi kaikki asiaan liittyvät potilasasiakirjat.

Huomio! Ilmoita, jos epäilet olevasi raskaana, koska tutkimuksessa käytetään röntgensäteitä.

Tutkimukseen valmistautuminen kotona

Ole syömättä ja juomatta vähintään 4 tuntia ennen tutkimusta. Jos käytät insuliinia, voit syödä nestemäisen aamiaisen ja pistää puolet pitkävaikutteisen insuliinin aamuannoksesta. Älä pistä lyhytvaikutteista insuliinia.

Älä käytä edellisen illan jälkeen tupakka- ja nikotiinivalmisteita.

Ota kaikki lääkkeesi normaalisti. Huomioi kuitenkin seuraavat poikkeukset:

-Diabeteslääke metformiini (esim. Metforem, Diformin, Glucophage) on jätettävä tauolle kaksi vuorokautta ennen tutkimusta.

-Jos käytät veren hyytymiseen vaikuttavaa lääkettä (Eliquis, Lixiana, Pradaxa, Xarelto), ota viimeinen tabletti toimenpidettä edeltävänä aamuna. Marevania ei tarvitse tauottaa tutkimuksen vuoksi.

-Nesteenpoistolääkkeet voit jättää ottamatta tutkimuspäivän aamuna.

Toimenpide

Hoitaja valmistele sinut tutkimusta varten. Sydämen varjoainekuvauksen tehdään paikallispuudutuksessa joko reisivaltimon tai rannevaltimon kautta. Valtimon kautta sepelvaltimon suulle viedään kuvauskatetri, jonka kautta suoneen ruiskutetaan varjoainetta. Samanaikaisesti kuvantamislaitteella otetaan kuvia eri suunnista. Varjoainekuvauksen kestäminen kestää noin puoli tuntia. Pallolaajennukseen kuluu aikaa enemmän.

5.9.2017

Jälkihoito

Pistopaikka suljetaan joko sulkulaitteella tai käsin painamalla. Vuodelevon pituuteen vaikuttaa pistopaikka (ranne/nivunen) ja se, tehdäänkö samalla pallolaajennus. Varaudu siihen, että aikaa menee useita tunteja.

Saat osastolta kirjalliset jälkihoito-ohjeet.

Kotiin pääsy

Varjoainekuvauksen ja ongelmattoman pallolaajennuksen jälkeen pääset kotiin samana päivänä. Pallolaajennuksen jälkeen kotona pitää varmuuden vuoksi olla yön yli toinen täysi-ikäinen henkilö. Toisinaan tarvitaan seuranta sairaalassa seuraavaan päivään.

Kotiin lähtiessä saat mukaan lääkeohjeet ja mahdollisesti tarvittavat kontrolliajat. Autolla ajaminen on kielletty toimenpidepäivänä. Tarvittaessa saat todistuksen matkakorvausta varten.

Sairausloman tarve arvioidaan työnkuvan ja tehdyn toimenpiteen perusteella.

Muuta

Jos sinulla on kuumetta, flunssa tai kysyttävää tutkimukseen liittyen, ota yhteys toimenpideyksikköön, p. 040 194 4884 ma-pe klo 8-14 välisenä aikana.